

پرسش

از هوسم جدا شدهام و یک پسر ۶ ساله دارم... در حال حاضر با یک مرد دیگر عقد کرده‌ام ولی نمی‌دانم چطور فرزندم را برای زندگی در محیطی که با هوسم متعلقه است آماده کنم و چگونه برای داشتن یک فرزند دیگر به او توضیح بدهم...

پاسخ

دکتر کتایون خوشی فوق تخصص رولوبیتراتی کودکان و نوجوانان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و باطنی

به نظر می‌رسد مساله خیلی خاص و پیچیده نیست... میلیون‌ها کودک در سراسر دنیا در شرایط مشابه فرزند شما زندگی می‌کنند... می‌توانید این نکته را به عنوان یک نکته مثبت برای فرزندتان مطرح کنید...

پرسش

پرسش اول: دو دختر ۳ساله و ۷ ساله دارم... هر دو از هوسم آب مروارید مادرزادی به ارث برده‌اند... بیماری به چنین وجود دارد؟

پرسش دوم

لطفا در مورد گذاشتن لنز طبی برای افرادی که نمی‌خواهند از عینک استفاده کنند توضیح دهید.

پرسش سوم

من یک لنز یک ساله خریداری کردم که در حال حاضر ۲ ماه است از تاریخ انقضای آن گذشته... آیا باز هم شب باید محلول آن استفاده کرده‌ام و کاملاً نو است... آیا می‌توانم باز هم از آن استفاده کنم؟

پرسش چهارم

اگر یک روز از لنز تماسی استفاده کرده‌ام که در حال حاضر شب باید محلول آن را عوض کنیم یا نیازی به این کار نیست؟

پاسخ

دکتر محمود بابایی جراح و متخصص چشم پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید ا (مد)

پاسخ اول: نه، متأسفانه با این زنتیک قوی که آب مروارید از مادر به هر دو کودک رسیده به احتمال قوی به فرزند سوم هم خواهد رسید... هر چند درصدی هم ممکن است فرزند سوم دچار این بیماری نشود اما نمی‌توان با این درصد کم خطر کرد...

پاسخ دوم: افراد زیادی هستند که تمایل دارند به جای عینک از لنز طبی استفاده کنند... متخصصان چشم، استفاده مقطعی و کوتاه از لنز مشکلی ندارد... مگر این که در صورت بروز مشکل چشمی تأثیر می‌گذارد و باعث خشکی چشم می‌شود...

کرد اما لنز هیچ‌کدام نباید جایگزین کامل عینک شود زیرا لنز در عین حال خطرات خاص خود را دارد... عوارض آن گاهی بسیار زیاد است... مخصوص افرادی که در شهرهای بزرگ و آلوده زندگی می‌کنند... عینک‌ها با محافظت از چشم در برابر آلودگی‌های زیاده‌ی در تماس هستند... اما در صورت لزوم استفاده از عینک را فراموش نکنید... عینک‌ها با محافظت از چشم در برابر آلودگی‌های زیاده‌ی در تماس هستند...

پاسخ سوم: نه، اصلاً مهم نیست که شما چند بار از لنز تان استفاده کرده‌اید... حتی اگر اصلاً هم لنز را به چشم‌تان نزنید... مهم این است که در صورت بروز مشکل چشمی به پزشک مراجعه کنید... عینک‌ها با محافظت از چشم در برابر آلودگی‌های زیاده‌ی در تماس هستند... عینک‌ها با محافظت از چشم در برابر آلودگی‌های زیاده‌ی در تماس هستند...

پاسخ چهارم: اگر از محلول خوب و استاندارد استفاده کرده باشید و شرایط شستشو و نگهداری از لنز استاندارد باشد، لازم نیست این کار را انجام دهید... اما اگر به‌دلت از لنزها استفاده می‌کنید، بهتر است هفته‌ای یکبار محلول آن را عوض کنید... در این حالت، اگر زیاد از لنز استفاده می‌کنید و مثلاً ۲ بار در روز لنز را می‌گذارید و برمی‌دارید، هر ۳ بار باید محلول را عوض کنید... در صورتی که این کار را انجام ندهید، چشم‌هایتان به شدت در معرض ابتلا به عفونت قرار خواهد گرفت... ضمن اینکه با این کار طول عمر لنزها هم کوتاه می‌شود و زودتر از بین می‌روند...

پرسش

وسپله‌ای که برای انجام کار دایلیز بیمار در دستش گذاشته‌اند، خراب شده است... این وسیله دقیقاً چیست و در حال حاضر چه باید بکنیم؟

پاسخ

دکتر آرنا جنایی فوق تخصص بیماری‌های کلیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

افرادی که به دایلیز نیاز دارند، لازم است قبل از دایلیز برخی اقدامات را انجام بدهند تا شرایط مناسب برای این کار را داشته باشند... اینک به عنوان دستگاه دایلیز استفاده کرد، باید وسیله‌ای را داخل رگ کار بگذاریم... این وسیله به‌دلت عروقی بیمار را به دستگاه دایلیز متصل می‌کند... برای انجام این کار چند روش وجود دارد... اگر بیمار بخواند به شکل حاد و فوری دایلیز شود، از وسیله‌ای در ناحیه گردن، ران و... استفاده می‌کنند... این وسیله گردش خون را از راه یک لوله به دستگاه دایلیز متصل می‌کند... این وسیله بیمار تصفیه می‌کند... گاهی وقت‌ها بیمار نمی‌خواهد از این وسیله استفاده کند یا تا زمان انجام دایلیز فرصت کافی دارد... ضمن اینکه گذاشتن این وسیله در ناحیه گردن خطراتی دارد... در این شرایط پزشک برای آدامس‌زای عروق از فیستول شریانی-شریانی کمکی می‌گیرد... به این شکل که بین سرخک و سیاهرگ در نقطه‌ای از بدن مثل دست، یک شانت یا پل ارتباطی برقرار می‌کند... این شانت از سرخک وارد سیاهرگ شود... با این کار به‌دلت فشار سرخک به سیاهرگ منتقل می‌شود... در نتیجه سیاهرگ‌ها ضخیم شده و برای انجام عمل دایلیز آماده می‌شوند... لوله وسیله‌ای در دست، کار گذاشته نمی‌شود و فقط ارتباطی بین سرخک و سیاهرگ برقرار می‌شود... سیاهرگ‌ها آماده دایلیز می‌شوند... این آمادگی ممکن است بین ۱ تا ۱۵ ماه و گاهی حتی تا ۲ ماه طول بکشد... به همین دلیل پزشک معمولاً ۲ ماه قبل از دایلیز اقدام به انجام این کار می‌کند... اگر این کار انجام نشود، سیاهرگ‌ها معمولاً پس از یکی - دو روز خراب می‌شوند و دیگر قابل استفاده نیستند... گاهی اوقات بیمار سیاهرگ خوبی ندارد بنابراین به جای سیاهرگ بیمار یک رگ مصنوعی از جنس ورنگس یا جنسی شبیه تفولون برای بیمار تهیه می‌کنند که بدن معمولاً آن را پس نمی‌زند و سپس فیستول شریانی-شریانی - وریدی را با آن برقرار می‌کنند... در نتیجه هنگام دایلیز سوزن وارد رگ مصنوعی می‌شود... احتمال دارد برای مادر شما یا رگ مصنوعی دچار مشکل شده باشد یا شانت یا همان پل ارتباطی بین سیاهرگ و سرخک بسته شده باشد... برای رفع این مشکل هم باید به جراح عروقی که این کار را برایتان انجام داده، مراجعه کنید تا شانت جدیدی در جای دیگری بگذارد... آمادگی‌سازی مجدد عروق با این کار نزدیک به ۲ ماه طول می‌کشد... در این مدت اگر بیمار به دایلیز نیاز داشته باشد، با روش اول برایش انجام می‌شود...

بیشتر بخوانید

دکتر عبیدی و پیوند کلیه را در ۱۸ صحنه و با کلیه‌های من چه کردی ای شده در ۱۹ صحنه ۱۹ زمین شماره بخوانید.

Advertisement for ZANON VITAMIC T-RQ. Features images of the product bottles and text describing its benefits for pregnancy and health. Includes contact information for ZANON VITAMIC.

Advertisement for Golden Life Co-Enzyme Q10. Features images of a woman, a man, and a child, along with the product packaging. Text describes the benefits of Co-Enzyme Q10 for energy and health.